



## 휴원을 요하는 전염병

병명	초기증상	잠복기간	격리기간
농가진	-얼굴이나 수족에 쌀알 크기의 발진, 수포가 생김	2~5일	-딱지가 떨어질 때까지
뇌막염	-고열, 두통, 구토, 전신에 보라색 반점, 의식의 혼동이 올	14~21일	-증상이 사라질 때까지
백일해	-열이 없고 밤에 기침이 심함	7~14일	-특유의 기침이 사라질 때까지
수두	-발열, 발진, 물집이 생김	10~21일	-딱지가 떨어질 때까지
수족구	-38℃정도의 고열, 1~2일간에 입속, 손바닥, 발바닥에 수포가 생김	3~6일	-주요 증상이 없어질 때까지
유행성 결막염	-눈이 붓고 흰자위가 충혈되며 눈곱이 많이 생김	7일	-급성 기염 증상이 없어질 때까지
볼거리	-발열, 귀밑이 부어 오름	7~21일	-귀밑 부기가 다 빠질 때까지
장티푸스	-두통, 헛소리, 혀의 백태, 열변, 장출혈이 발생	1~3주	-완치될 때까지
전염성 설사	-설사의 횟수가 많고, 변이 물갈고, 열과 감기 증상을 동반함	2~4일	-주요 증상이 없어질 때까지
전염성 홍반	-열은 별로 없으나 때로는 37℃의 열이 남 얼굴과 뺨에 발진이 생김	7~14일	-급성 증상이 없어질 때까지
콜레라	-열, 구토, 허연 물설사, 탈수 증세있음	6시간~5일	-완치될 때까지
풍진	-가벼운 감기 같고, 발열과 발진이 일어남	10~21일	-증상이 없어질 때까지
홍역	-발열, 재채기, 결막염, 발진이 일어남	9~13일	-발진이 없어질 때까지

※ 이상의 질환은 전염성이 강한 질병으로써 각별한 주의가 필요함

이외에 의사의 진단에 의해 전염성이 있다고 판명된 질병은 휴원을 요함

통원은 의사의 다 나왔다는 소견서가 있을 때에 가능